



ZUSAMMENSETZUNG:

Kunststoff-Dispenser mit verdampfendem Wirkstoff:

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetat min. 689 g/kg, (Z)-9-Dodecen-1-yl acetat min. 80 g/kg.

Zulassungsnummer: 00B378-00



GEFAHRENHINWEISE: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Wirksamkeit des Produktes nicht zu gefährden.

Der BLOOTWIN® L+ Diffusor wird aus biologisch abbaubaren Polymeren hergestellt

DOSIERUNG: 250 Dispenser /ha. Die Dispenser gleichmäßig über die zu behandelnde Fläche verteilen.

ANWENDUNGSMETHODE: Die Dispenser müssen unbedingt vor dem erwarteten Flugbeginn des jeweiligen Wickers angewendet werden. Wenn Daten fehlen, wird ein anfänglicher Einsatz von Pheromonfallen zur Befallsüberwachung empfohlen. Das Produkt ist wirksam während der gesamten Flugzeit der Traubenwickler während einer Vegetationsperiode.

WARTEZEITEN: (F) Freiland: Weinrebe Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Rebflächen mit geringem Befall können durch die Verwirrungsmethode angemessen geschützt werden. Bei mittleren oder hohen Befallszahlen ist in den ersten Anwendungsjahren eine Kombinationsstrategie mit

SICHERHEITSHINWEISE: P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt/ Behälter als Sonderabfall über die Schadstoffsammelstellen oder gewerblichen Entsorgungsfirmen beseitigen.

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungseräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

(NW262) Das Mittel ist giftig für Algen (NW263) Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. (SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. (SB005) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. (SB010) Für Kinder unzugänglich aufbewahren. (SB111) Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. (SB166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. (SS206)

Insektiziden erforderlich. Die Verwendung von Insektiziden beeinträchtigt die Funktion der Dispenser nicht, sodass Sie jederzeit eingreifen können.

Befruchtete Weibchen von benachbarten Weinbergen können unvorhergesehene Schäden verursachen. Überprüfen Sie die Trauben regelmäßig auf Befall und greifen Sie bei Bedarf mit Insektiziden ein. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn die Anwendung für große Bereiche ausgeführt wird. Kleine Rebflächen können auch geschützt werden, wenn sie isoliert sind und eine geringe Population aufweisen. In diesen Fällen ist es jedoch angebracht, die höhere Dosierung zu verwenden, um die Konzentrationsverluste aufgrund von Windeinflüssen zu verringern. Es wird empfohlen, die Verwendung auf kleinen Flächen zu vermeiden, die an andere Weinberge grenzen, die nicht mit der Verwirrungsmethode behandelt wurden oder sich innerhalb dieser befinden. Pheromone sind schwerer als Luft und bewegen sich nach unten. In steilem Gelände oder in der Nähe von stark befahrenen Straßen ist es schwierig, eine angemessene Konzentration von Pheromonen aufrechtzuerhalten. Anhaltende starke Winde und anhaltend hohe Temperaturen können die Wirkungsdauer des Dispensers verkürzen. Unter diesen Bedingungen kann es notwendig sein, die Dosierung zu erhöhen oder kombinierte Strategien einzusetzen.

KONTROLLE: Aufstellen von Überwachungsfallen und regelmäßige (wöchentliche) Überprüfung, ob keine Fänge vorhanden sind, um festzustellen, ob die Konzentration des freigesetzten Pheromons ausreicht. Überprüfen Sie die Trauben alle 1-2 Wochen in regelmäßigen Abständen entsprechend der Befallsgefahr durch die Zielinsekten, um

Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

(NB663) Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet (B3). (NN1001) Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. (NN1002) Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.

Inhalt/Paket: 100 Dispenser.

ZulassungsinhaberIn: CBC (Europe) S.r.l., via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), Italien – Tel: 035-335313

Herstellung und verpackung:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Nishifukushima, Kubiki-ku, Joetsu-shi, Niigata 942-8601, Japan

möglichen Befall zu erkennen und bei Bedarf mit Insektiziden einzugreifen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT: Originalverpackung dicht geschlossen an einem sicheren Ort bei maximal 5°C aufbewahren. Bei maximal 5°C ist das Produkt 3 Jahre haltbar.

VERANTWORTLICHKEIT DES LIEFERANTEN: Die Wirksamkeit des Produkts hängt von verschiedenen Faktoren während und nach der Anwendung ab, sowie von der Fähigkeit des Benutzers, den Ausbruch des Befalls zu erkennen. Die Haftung des Lieferanten ist auf die Übereinstimmung des Produkts mit den Angaben auf dem Etikett beschränkt.

ACHTUNG:

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Wer das Produkt anwendet, ist für eventuelle Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch verantwortlich.

Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

CHARGENNUMMER UND PRODUKTIONSdatum: siehe Packung