



M E L O

Strategie per la Difesa Sostenibile



DIFESA: insetti ed acari

CARPOCAPSA



NEMAPOM® 1,5 mld/ha

Trattamento in tarda estate - autunno per abbattere la popolazione svernante con benefici effetti per l'annata successiva.

MISTER C 2-3 unità/ha

(vedi caratteristiche generali a pag. 3)

Isomate® C plus 1000 dif./ha

Oppure

Isomate® C TT 500 dif./ha

Diffusori Shin-Etsu rispettivamente a singolo e doppio capillare per la tecnica della confusione sessuale nei confronti della Carpocapsa. In entrambi i casi eseguire l'installazione prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Isomate C TT è impiegabile solo su ampie superfici (>2ha).

MADEX® TOP 50-100 ml/ha

Insetticida microbiologico a base di GranuloVirus (CpGV - isolato V15) per il controllo della Carpocapsa.

RICAMATORI



Isomate CLR MAX TT 750 dif./ha

Diffusore Shin-Etsu a doppio capillare per la tecnica della confusione sessuale nei confronti della Carpocapsa e Ricamatori. Eseguire l'installazione prima dell'inizio del volo della Carpocapsa.

MISTER C LR 2-3 unità/ha

È una bomboletta aerosol in alluminio estruso contenente il feromone della Carpocapsa e quelli dei ricamatori. La bomboletta è abbinata ad un apposito diffusore temporizzato (MISTER PRO).

CAPEX® 100 100 ml/hl

Prodotto a base di Granulo Virus specifico per la Capua.

LEPINOX® PLUS 0,75-1,5 kg/ha

Oppure

RAPAX® AS 1-2 l/ha

Intervenire al superamento delle soglie di tolleranza, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. Efficace anche nei confronti della Piralide.

SHINDO TRAP



Innovativa trappola che agisce combinando l'azione di un feromone di aggregazione con la vibrazione specifica di *Haliomorpha halys* (Cimice asiatica).



CIDIA O TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO



Isomate® C/OFM 800-1000 in etichetta

Diffusore Shin-Etsu a singolo capillare per la tecnica della confusione sessuale nei confronti di Carpocapsa e di Cidia del pesco. Per aziende dove si registrano sporadiche catture di Cidia. Eseguire l'installazione prima dell'inizio del volo di quest'ultima specie.

MISTER CG

(vedi caratteristiche generali a pag. 3)

Oppure

Isomate® OFM rosso FLEX 500-600 dif./ha

Diffusore Shin-Etsu a doppio capillare (di cui uno vuoto), per la tecnica della confusione sessuale nei confronti della Cidia. Applicare prima dell'inizio del volo della generazione svernante di Cidia, in combinazione ai diffusori specifici per Carpocapsa (Isomate C plus, Isomate C TT o MISTER C), in aziende con elevate pressioni di entrambi i carporfagi.

MADEX® TWIN 50-100 in etichetta

Insetticida microbiologico a base di GranuloVirus (CpGV isolato V22) per il controllo della Carpocapsa e della Cidia del pesco. Ideale per trattamenti in prossimità della raccolta. Intervenire al superamento della soglia di tolleranza, ripetendo il trattamento dopo 6-8 giorni, a seconda che si utilizzi il dosaggio minore o maggiore di etichetta.

AFIDE GRIGIO



CIMICE ASIATICA



PSILLE DEL MELO



NEEMAZAL®-T/S 2-3 l/ha (200-300 ml/hl)

Effettuare un trattamento in pre-fioritura nella fase di bottoni rosa; ripetere il trattamento in post-fioritura. La miscela con aminoacidi (Plantech a 1-3 kg/ha) migliora l'efficacia di questi trattamenti.

PYGANIC® 1.4 2,5 l/ha

Trattare alla presenza degli stadi giovanili, ripetendo il trattamento dopo 3-5 giorni. Per il monitoraggio della cimice si consiglia di usare la Shindo Trap.

PYGANIC® 1.4 2,5 l/ha

2-3 trattamenti come da indicazioni dei servizi fitosanitari. È possibile miscelare Pyganic 1.4 con UFO (2 L/hl) per potenziarne l'azione.

DIFESA: insetti ed acari

RAGNETTO ROSSO



*UFO® - 2 l/hl

Da solo o con acaricidi di sintesi. I trattamenti con UFO sono registrati anche nei confronti delle cocciniglie, afidi e psilla. Indirettamente esercitano una certa efficacia anche contro le uova di lepidotteri.

NATURALIS® - 1-1,5 l/ha

Efficace prevalentemente su uova e stadi giovanili. Eseguire almeno 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni, dalla primissima comparsa. Se non si interviene tempestivamente è possibile la miscela al primo trattamento con un adulticida.

MINATORI FOGLIARI (CEMIOSTOMA, LITOCOLLETE)



NEEMAZAL®-T/S - 2-3 l/ha (200-300 ml/hl)

Il trattamento con NEEMAZAL-T/S in pre-fioritura contro l'Afide grigio è efficace anche contro la prima generazione del Cemiostoma.

COCCINIGLIA



*UFO® - 2 l/hl in primavera-estate - 2.5 l/hl in inverno

Intervenire alla rottura delle gemme utilizzando il dosaggio di 2.5 l/hl. Durante il periodo estivo è impiegabile da solo nei confronti delle neanidi (2l/hl).

RODILEGNO GIALLO



Isonet® Z - 300 dif./ha

Diffusore Shin-Etsu a singolo capillare per la tecnica della confusione sessuale nei confronti del Rodilegno giallo.

MAXI ZEUCO - 6-10 trap./ha

Trappole per la cattura massale e/o monitoraggio. Installarle 30-50 cm sopra la vegetazione attivate con il feromone specifico. Le due tecniche descritte vanno applicate prima dell'inizio del volo della generazione svernante, oppure, in alternativa per più anni, per avere una riduzione significativa della popolazione. I trattamenti eseguiti con NEMAPOM 1.5 mild/ha nei confronti delle larve svernanti di Carpocapsa sono efficaci anche nei confronti delle larve di Rodilegno giallo.

AFIDE LANIGERO



NATURALIS® 1-2 l/hl

Eseguire un ciclo di 2-3 trattamenti alla comparsa delle prime colonie. È possibile intervenire anche sulle re-infestazioni estive nello stesso modo.

NATURALIS è selettivo nei confronti di *Aphelinus mali* e non ha tempo di carenza.

Linea MISTER

Questa linea di prodotti si compone di bombolette aerosol in alluminio estruso (MISTER) contenenti la formulazione di codlemone, il feromone Carpocapsa, da solo (**MISTER C**) o in miscela col feromone dei principali ricamatori (**MISTER C LR**) o quello della Cidia del pesco (**MISTER C G**). In tutti la formulazione è completata da un propellente senza effetto serra. Il MISTER è abbinato ad un apposito diffusore temporizzato (MISTER PRO), pre-programmato e dotato di un sensore di temperatura che blocca il rilascio a basse temperature. L'azionamento del diffusore può avvenire all'inserimento della bomboletta oppure in seguito rispetto al posizionamento in campo, grazie ad un programma di ritardo dell'attivazione selezionabile.

PRE-PROGRAMMATO: il programma è già impostato sul dispositivo e si attiverà in maniera specifica per la sola Carpocapsa o per la Carpocapsa e le altre specie da confondere in abbinamento.

SENSORE DI TEMPERATURA: soprattutto durante periodi primaverili, caratterizzati da basse temperature notturne, il codlemone potrebbe formare un cono di cera sull'ugello della bomboletta. Il diffusore previene questo fenomeno non erogando a basse temperature che causano anche l'inattività della Carpocapsa e degli altri lepidotteri da confondere.

MASSIMA AFFIDABILITÀ: I diffusori (MISTER PRO più MISTER) vengono sostituiti ogni anno, per garantirne le migliori prestazioni e consentire un solo passaggio in campagna: al momento dell'applicazione del nuovo diffusore si può infatti prelevare quello dell'anno precedente.

INSTALLAZIONE IN CAMPO

Installare i diffusori prima dell'inizio del volo della generazione svernante di Carpocapsa. Posizionarli nella parte alta della pianta, fino a mezzo metro sopra chioma, sfruttando l'utilizzo dell'apposito gancio in dotazione. Creare una griglia di diffusori equidistanti tra loro. Per un dosaggio di 2 MISTER/ha, ogni MISTER deve essere distante circa 80 metri dall'altro.



* Fare attenzione quando si usano gli oli paraffinici estivi (tra cui UFO) agli interventi con zolfo, captano, dithianon, fluazinam ecc.. (si vedano in proposito le tabelle di compatibilità), che devono essere distanziati di almeno 10 giorni sia prima che dopo l'intervento, per non avere problemi di fitotossicità. Nel caso di agrofarmaci contenenti fluazinam distanziare l'impiego di oli estivi non meno di 20 gg.

Prodotti per la confusione sessuale su MELO

	Insetto/i target	Composizione	Epoca di applicazione*	Diffusore con capillare	Contenuto di p.a./diffusore	Durata (giorni)°	dose/ha (diffusori)	Classificazione CLP	Note applicative
Isomate C plus  	Carpocapsa del melo (<i>C. pomonella</i>)	(E,E)-8-10 Dodecadien-1-ol Dodecan-1-ol Tetradecan-1-ol	Primi giorni di Aprile	Singolo	200 mg	almeno 150	in etichetta 800-1000	  ATTENZIONE	superfici < 2ha
Isomate C TT  	Carpocapsa del melo (<i>C. pomonella</i>)	(E,E)-8-10 Dodecadien-1-ol Dodecan-1-ol Tetradecan-1-ol	Primi giorni di Aprile	Doppio (entrambi pieni)	417 mg	almeno 150	500	  ATTENZIONE	superfici > 2 ha
MISTER C  	Carpocapsa del melo (<i>C. pomonella</i>)	(E,E)-8,10 Dodecadien-1-ol solvente e propellente	Primi giorni di Aprile	Aerosol	50.2 mg	180	2/3	  ATTENZIONE	superfici +/- 15 ha
Isomate CLR MAX TT  	Carpocapsa del melo (<i>C. pomonella</i>) Ricamatori	E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol Dodecan-1-ol Tetradecan-1-ol (Z)-9-Tetradecenyl acetate (Z)-11-Tetradecenyl acetate	Primi giorni di Aprile	Doppio (entrambi pieni)	360 mg	almeno 150	750	 ATTENZIONE	
MISTER C LR  	Carpocapsa del melo (<i>C. pomonella</i>) Ricamatori	E,E)-8,10 Dodecadien-1-ol (Z)-9-Tetradecenyl acetate (Z)-11-Tetradecenyl acetate	Primi giorni di Aprile	Aerosol	96,9 g	150	2/3	  ATTENZIONE	superficie + 15 ha
Isomate C/OFM  	Carpocapsa del melo (<i>C. pomonella</i>) Cidia del pesco (<i>G. molesta</i>)	(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol Dodecan-1-ol Tetradecan-1-ol (Z)-8-Dodecenyl acetate (E)-8-Dodecenyl acetate Z-8-Dodecen-1-ol	*Fine Marzo/ Inizio Aprile	Singolo	212 mg	130-150 <i>C. pomonella</i> 80-90 <i>G. molesta</i>	800-1000	  ATTENZIONE	Per aziende con poche catture/ stagione di <i>G. molesta</i> . In caso di danni si consiglia di applicare i due prodotti separati per abbassare le popolazioni e poi passare a C/OFM.
MISTER CG  	Carpocapsa del melo (<i>C. pomonella</i>) Cidia del pesco (<i>G. molesta</i>)	(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Z)-8-Dodecenyl acetate (E)-8-Dodecenyl acetate Z-8-Dodecen-1-ol	Fine marzo	Aerosol	73 g	150	2-3	   ATTENZIONE	superficie +/- 15 ha
Isomate OFM rosso FLEX  	Cidia del pesco e susino (<i>G. molesta</i> , <i>C. funebrana</i>)	(Z)-8-Dodecenyl acetate (E)-8-Dodecenyl acetate Z-8-Dodecen-1-ol	Fine Marzo/ Inizio Aprile	Doppio (solo un capillare con feromone)	254 mg	almeno 150	500-600	  ATTENZIONE	
Isonet Z  	Rodilegno giallo (<i>Z. pyrina</i>) Sesia del ribes (<i>S. tipuliformis</i>)	(E,Z)-2,13-Octadecadienyl acetate (E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate	Ultima decade di Aprile	Singolo	66 mg	almeno 150	300	 ATTENZIONE	

* Epoca di applicazione indicativa in relazione all'inizio del volo dell'insetto target più precoce nella zona di applicazione

° Durata di rilascio indicativa in relazione alle medie giornaliere di temperatura e di vento della area trattata

MALATTIE FUNGINE: strategie di difesa



Rigonfiamento gemme



Punte verdi



Orecchiette di topo



10% fioritura



Piena fioritura



Fine fioritura



Allegagione



Accrescimento frutti



Maturazione avanzata



Caduta foglie



COLPO DI FUOCO BATTERICO



TICCHIOLATURA



OIDIO



CANCRI DEL LEGNO
(*Nectria galligena*, *Phomopsis mali*,
Sphaeropsis malorum, *Pseudomonas syringae*)

HELIOCUIVRE® - 250 ml/hl

AMYLO-X® - 1,5 kg/ha

Permette di contenere la moltiplicazione (spesso asintomatica) del patogeno nel fiore. 2-3 interventi durante la fioritura.

AMYLO-X® - 1,5 - 2,5 kg/ha

Intervenire in previsione di condizioni climatiche avverse predisponenti all'infezione (grandine, temporali estivi di forte intensità ecc.) o immediatamente dopo.

HELIOCUIVRE® 200 ml/hl
Fino a prima della fioritura

HELIOSOUFRE S® 2-7 l/ha

In pre-fioritura può essere miscelato a Heliocuire.

VITIKAPPA® max 7,5 kg/ha (mantenere una concentrazione di almeno 500 g/hl)

Intervenire entro 200-400 gradi ora dall'inizio della pioggia infettante (100-300 gradi ora da inizio infezione); il prodotto non ha azione preventiva.

VITIKAPPA® - Fino a 5 kg/ha

HELIOSOUFRE S® - 3-5 l/ha

HELIOCUIVRE®
250-350 ml/hl

HELIOCUIVRE®
250-350 ml/hl



PLANTECH

Concime organico azotato a base di aminoacidi
100% vegetali in formulazione GEL.

Proprietà

- Biostimolante
- nutritiva
- acidificante (il partner ideale per Neemazal -T/S)

Amesso in agricoltura Biologica.



Delta Trap Orange

Delta Trap Orange è una trappola in laminato di propilene arancione preformato, di facile impiego e lunga durata. Grazie alla sua struttura, permette una rapida ispezione del fondino collato, facilmente estraibile dal corpo centrale, senza entrare a contatto con la colla.

Può essere attivata con l'**erogatore standard** ad imbibizione (durata di 4-6 settimane) specifico per Carpocapsa, Cidia del pesco, ecc. Per Carpocapsa è disponibile anche l'**Erogatore CMDA COMBO + AA**. Questo erogatore, attirando anche le femmine, consente di monitorare il volo della Carpocapsa anche in presenza della confusione sessuale.

AGROFARMACI registrati su MELO



MADEX® TOP

Insetticida a base di GranuloVirus (CpGV- isolato V15) per il controllo della Carpocapsa. Formulazione efficace anche su II e III generazione.



MADEX® TWIN

Insetticida a base di GranuloVirus (CpGV isolato V22) per il controllo della Carpocapsa e della Cidia del pesco.



AMYLO-X®

Fungicida - battericida a

base di *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* ceppo D747,

efficace contro il Colpo di fuoco batterico.



LEPINOX® PLUS e RAPAX® AS

Insetticidi a base di *B.thuringiensis* varietà *kurstaki* ceppo EG 2348 per il controllo dei Tortricidi, dell'Orgia e dell'Euzofera.

	Prodotto	Principio Attivo	CONC. p.a. (% peso/peso)	DOSAGGIO (min/max)	Classificazione CLP	Tempo di carenza gg.
FUNGICIDI	Amylo-X  	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> ceppo D747	25% (Minimo 5 x 10 ¹⁰ CFU/g)	1,5 - 2,5 kg/ha	NC	0
	Heliosoufre S  	Zolfo puro (su base terpenica)	51,1% (= 700 g/l)	3-7 l/ha	PERICOLO 	3
	Heliocuire 	Rame metallo puro sotto forma di idrossido (su base terpenica)	26,2% (=400 g/l)	200-350 ml/hl	PERICOLO   	20
	Vitikappa  	Bicarbonato di potassio	995 g/kg	max 7,5 kg/ha	NC	0
INSETTICIDI	Lepinox Plus  	<i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i> Ceppo EG 2348	37,5% (Potenza: 32.000 UI T.ni/mg)	0,75 - 1,5 kg/ha	NC	0
	Rapax AS  	<i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i> Ceppo EG 2348	18,8% (Potenza: 24.000 UI T.ni/mg)	1 - 2 l/ha	NC	0
	Biopiren Plus 	Piretrine pure (purezza 500 g/kg)	2% (= 18,61 g/l)	140 - 200 ml/hl	ATTENZIONE 	2
	Pyganic 1.4 	Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	1,4% (= 12,91 g/l)	150 - 250 ml/hl	ATTENZIONE  	7
	Neemazal-T/S 	Azadiractina A	1% (= 10 g/l)	2 - 3 l/ha	NC	3
	Madex TOP  	CpGV (<i>Cydia pomonella</i> GranuloVirus-Isolato V15)	1% (= 3 x 10 ¹³ granuli/l)	50-100 ml/ha	NC	3
	Madex TWIN  	CpGV (<i>Cydia pomonella</i> GranuloVirus isolato V22)	1% (= 3 x 10 ¹³ granuli/l)	50-100 ml/ha	NC	3
	Capex 100  	AoGV (<i>Adoxophyes orana</i> GranuloVirus-Isolato V15)	1% (= 5 x 10 ¹³ granuli/l)	100 ml/ha	NC	3
	Naturalis  	Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040	0,0185% (Minimo 2,3 x 10 ⁷ spore vitali/ml)	1 - 2 l/ha	NC	0
	UFO  	Olio minerale paraffinico	96.9 % (=790 g/l)	2-2.5 l/hl	PERICOLO 	1
COADIUVANTI	Nu-Film-P 	Poly-1-p-menthene	96% (= 892,8 g/l)	250 - 400 ml/ha	ATTENZIONE  	*

*Rispettare il tempo di carenza dei prodotti in abbinamento

NUTRIZIONE



AUTUNNO / INVERNO
Terreno

AGRO LIG®
200-400 kg/ha

Ideale per la concimazione all'impianto, con distribuzione nel solco di trapianto dei moderni frutteti ad alta densità. Può essere utilizzato anche successivamente con distribuzione sulla fila nel corso dell'inverno. Migliora le caratteristiche fisico chimiche del terreno e le proprietà agronomiche.



FINE INVERNO
Terreno

PRODIGY®
300-600 kg/ha

Apporto di azoto prontamente disponibile per la ripresa vegetativa, di fosforo e potassio organici. L'elevato contenuto di siderofori favorisce anche un migliore assorbimento del ferro. Grazie alla sua elevata solubilità, non necessita di interrimento.
+
Eventuale concimazione fosfo potassica minerale.

TRATTAMENTI FOGLIARI



ORECCHIETTE DI TOPO
MAZZETTI AFFIORANTI

ACADIAN® MPE
0.75-1 kg/ha

Facilita la ripresa vegetativa e prepara la pianta alla fioritura.



BOTTONI ROSA

ACADIAN® MPE
0.75-1 kg/ha

Migliora l'equilibrio ormonale della pianta e conferisce maggiore resistenza nei confronti di ritorni di freddo durante la fioritura.



10% FIORITURA

CYTOKIN®
500 ml/ha

Per favorire l'allegagione e contenere lo sviluppo vegetativo della pianta.
Oppure

**LYSODIN®
BORON EXPRESS**
1,5 kg/ha

LIXOR® MICRO
1,5 kg/ha

Per favorire l'allegagione ed apportare microelementi prontamente disponibili.



30/50% FIORITURA

CYTOKIN®
500 ml/ha
+
SOL-U-GRO®
12-48-8
2,3 kg/ha



ALLEGAGIONE

**PHYTAGRO®
PLUS**
1 kg/ha

Oppure

ACADIAN® MPE
0.75-1 kg/ha

**LIXOR® CALCIUM
+ MG**
3-6 kg/ha

**LIXOR®
MAGNESUM**
3 kg/ha

2-3 trattamenti a distanza di 14 giorni.



ACCRESIMENTO FRUTTI

**NUTRIENT
EXPRESS®**
18-18-18
2,3 kg/ha

Oppure

NUTRI LEAF®
20-20-20
2,3 kg/ha

**LIXOR®
CALCIUM + MG**
3 - 6 kg/ha

3-4 trattamenti a 7-10 giorni di distanza.



INVAIATURA

**NUTRIENT
EXPRESS®**
4-41-27
4,6 kg/ha

Favorisce la colorazione delle varietà più tardive.



POST RACCOLTA

**LYSODIN®
BORON EXPRESS**
1,5 kg/ha

ACADIAN® MPE
0.75-1 kg/ha

Per favorire l'accumulo di sostanze di riserva utili per una buona ripartenza nell'annata successiva.

FERTIRRIGAZIONE

HUMOPLANT
2-4 kg/ha

2 - 4 trattamenti a cadenza mensile. Migliora le caratteristiche fisiche del terreno favorendo l'assimilazione delle sostanze nutritive.

SOL IRON 48®
20-40 g/pianta

Per contrastare fenomeni di clorosi ferrica. Distribuire preferibilmente il quantitativo indicato in 2-3 trattamenti a cadenza mensile.

RIZOPLANT
0.5 kg/ha

Applicare al trapianto e/o quando la radice è in attiva crescita. Favorisce lo sviluppo di un apparato radicale profondo e forte.

**GREEN HOUSE
SPECIAL® 12-48-8**
11,3 - 22,6 kg/ha

**GREEN HOUSE
SPECIAL® 30-10-10**
11,3 kg/ha

2 trattamenti a distanza di 7-10 giorni.

**GREEN HOUSE
SPECIAL® 20-20-20**
11,3 kg/ha

Alternato a

**GREEN HOUSE
SPECIAL® 9-15-30**
11,3 kg/ha

Trattamenti settimanali durante il mese di Giugno.

**GREEN HOUSE
SPECIAL® 9-15-30**
11,3 kg/ha

RIZOPLANT
0,5 kg/ha

Favorisce la deposizione delle sostanze di riserva nella radice per il corretto germogliamento nell'anno successivo.

Rizoplant

Inoculo di funghi micorrizici a base di *Funneliformis mosseae*, *Funneliformis caledonius*, *Rhizoglyphus irregularis*.



Strategie per la difesa sostenibile



Alla luce delle attuali esigenze del mercato e dei consumatori, le linee di difesa che proponiamo possono essere considerate come la più attuale frontiera della difesa fitosanitaria.

Ormai tutti sono perfettamente consapevoli che non si potrà contare solo sulla chimica per il contenimento dei patogeni e dei fitofagi. In accordo con il nostro motto ***“biological First”***, oggi è necessario basare la difesa delle colture su strumenti di biocontrollo sostenibili, integrandoli quando necessario con quelli di sintesi in modo equilibrato, al fine di ottenere produzioni sane e qualitativamente superiori nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Nelle strategie di difesa allegate vengono proposti in campo tutti i mezzi disponibili, ecocompatibili ed innovativi che BIOGARD ha messo a punto e che sono presenti sul mercato in un'unica strategia di difesa che si propone diversi obiettivi:

- Ottenere produzioni in accordo ai migliori standard qualitativi e quantitativi. Ridurre nel contempo gli input chimici nell'ambiente di coltivazione.
- Ridurre i rischi di sviluppo di popolazioni o ceppi resistenti ai mezzi chimici (o biologici) in modo da mantenere inalterata per lungo tempo l'efficacia degli agrofarmaci.
- Consentire, quando richiesto, la produzione di derrate alimentari a residuo zero, o con un numero limitato di residui, grazie all'impiego di prodotti privi di residuo determinabile contraddistinti dal marchio No Residue.
- Rinnovare, grazie ad una solida base tecnica, l'approccio alla difesa fitosanitaria del tecnico e dell'agricoltore.

Tutto questo è possibile grazie ai prodotti che BIOGARD offre e assiste nella corretta applicazione.

Si tratta di un portafoglio di mezzi innovativi e alternativi, un'offerta assolutamente unica in Italia e in Europa che può fornire accesso al più alto livello di sviluppo dell'approccio al contenimento sostenibile delle avversità delle colture.

Divisione BIOGARD

Sede Legale e Centro Logistico
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035.335313
infobiogard@cbceurope.it

AREA TECNICA

Via Civinelli 1090
47522 CESENA (FC)
Tel. 0547 630336
tecnicobiogard@cbceurope.it

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.