

**BIOGARD®**Division of **CBC** (EUROPE)

NATURALIS®

Nützlings-Kompatibilität



Juli 2023

Nützlinge	Eier	Larven	Adulte
Amblyseius californicus – Raubmilbe	1		1
Amblyseius cucumeris - Raubmilbe		1	1
Amblyseius swiirski – Raubmilbe		2	2
Anthocoris nemoralis – Raubwanze		1	1
Aphelinus mali		1	1
Aphidius colemani – Schlupfwespe			1
Aphidoletes aphidimyza			
Atheta spp.			
Bombus terrestris – Erdhummel			A (0)
Chrysoperla carnea – Gemeine Florfliege		1	1
Dacnusa sibirica			
Diglyphus isaea – Schlupfwespe			1
Encarsia formosa – Erzwespe		1	1
Feltiella spp.			
Hypoaspis spp.			
Iphiseius degenerans			1
Macrolophus pygmaeus – Raubwanze		1	1
Nesidiocoris tenuis – Raubwanze		1	
Orius spp. – Raubwanze		1	1
Orius laevigatus – Raubwanze		1	1
Phytoseiulus persimilis – Raubmilbe	1	2	1
Steinernema feltiae – Nematoden		1	1
Steinernema carpocapsae - Nematoden		1	1
Stethorus punctillum – Kugelmarienkäfer			1

Toxizität	Mortalität	Bedeutung für Nützlinge	Empfehlung
0	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
1	< 25%	harmlos	Nützling kann gleichzeitig eingesetzt werden
2	25-50 %	leicht gefährlich	Nützling nicht direkt vor oder nach Naturalis Spritzung ausbringen, Nützling 24 h nach Naturalis Spritzung freilassen
3	50-75 %	gefährlich	5 Tage Abstand halten zwischen Naturalis Spritzung und Nützlingseinsatz
4	> 75%	sehr gefährlich	mindestens 7 Tage Abstand zwischen Naturalis Spritzung und Nützlingseinsatz
		A	kann in Kombination mit Hummeln ausgebracht werden, während der Spritzung sollten sich die Hummeln sicherheitshalber im Stock befinden

**BIOGARD®**
Division of **CBC** (EUROPE)**CBC - BIOGARD – CBC (Europe) GmbH**

Fritz-Vomfelde-Straße 6, 40547 Düsseldorf

Tel.: +49(0) 211-53067-0

e-mail: schroeder@cbc-europe.com